

NEINVAZIVNÍ LIPOSUKCE

KAVITACE

Beauty
STUDIO
LETNÁ

Rychlá, bezpečná, zcela bezbolestná liposukce bez narušení integrity kůže.

Úbytek viditelný již po první ošetření.

Trvalý efekt srovnatelný s klasickou liposukcí.

Nová unikátní metoda k formování postavy, odbourávání tukových ložisek v problémových partiích, redukci celulitidy, vypnutí pokožky. Ošetření větších ploch i menších partií. Přesné zacílení liposukce na ošetřovanou partii.

POUŽITÍ: Břicho, stehna, hýždě, boky, kolena, předloktí

CENÍK:

40 minut /20 min. kavitace + 20 min. presoterapie/	1.500,-- Kč
50 minut /30 min. kavitace + 20 min. presoterapie/	1.900,-- Kč
60 minut /40 min. kavitace + 20 min. presoterapie/	2.400,-- Kč
70 minut /50 min. kavitace + 20 min. presoterapie/	2.900,-- Kč
80 minut /60 min. kavitace + 20 min. presoterapie/	3.200,-- Kč

VYZKOUŠEJTE TUTO REVOLUČNÍ METODU.

Beauty STUDIO LETNÁ, Letenské nám. 4, Praha 7, tel.:724768505

Jak kavitace funguje?

Princip kavitace spočívá v přenosu ultrazvukových vln do podkoží, kde vyvolávají v ošetřované tukové tkáni mechanickou vibraci a dochází k pohybu buněk, tím vznikají uvnitř tukových buněk mikrobublinky, které se postupně rozpínají a zvětšují, narážejí na křehké buněčné stěny až dojde k narušení celistvosti tukové buňky, zhroucení dovnitř, prasknutí a zániku. Po zničení tukové buňky putuje uvolněný tuk do mezibuněčného prostoru a následně je vyloučen lymfatickým systémem ven z těla. Proto se doporučuje před a hlavně po kavitaci zvýšený příjem tekutin a lymfodrenáž.

Průběh ošetření

Doporučujeme 2 dny před ošetřením rozproudit lymfatický systém zvýšeným pitným režimem. Ošetření probíhá bez anestezie, bez bolesti, bez hospitalizace. Trvá 20-60 minut podle velikosti ošetřované oblasti. Během jednoho sezení dochází k obvodovému úbytku 2-6 cm. Samozřejmě každý jedinec reaguje individuálně.

Pro dosažení maximálního účinku lze ošetření opakovat po 10-14 dnech. Po ošetření je nutné dodržovat opět pitný režim.

Doporučují se minimálně tři ošetření jedné partie. Následnou udržovací péči lze provádět každých 5 – 6 měsíců.

Kontraindikace

Těhotenství, menstruace, onemocnění srdce (kardiostimulátor atd.), velké kovové implantáty, rakovina, epilepsie, onemocnění kůže, otevřené zranění, onemocnění jater, ledvin, oběhové soustavy a léčba antibiotiky.

Nepříznivé efekty

Pokud je léčba prováděna podle instrukcí popsaných zde, nejsou očekávány žádné vedlejší efekty.

